

MIĘDZYZĘBOWOŚĆ

Moje dziecko* mówi z językiem między zębami/wargami – czy to jest wada wymowy?

TAK

~~NIE~~

Dlaczego?

Ponieważ, w języku polskim głoski są wymawiane z językiem schowanym w jamie ustnej, a granicę jego ułożenia stanowi wewnętrzna strona zębów.

1. Czy dziecko z wady wyrośnie?

Nie, trzeba pójść do logopedy.

2. Jakich głosek może dotyczyć wada?

Wada może dotyczyć: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, r, l, t, d, n”.

3. Kiedy należy rozpocząć terapię logopedyczną?

Od chwili pojawienia się (zauważenia wady przez dorosłych).

4. Jaka jest bezpośrednia przyczyna wady?

Nieprawidłowa praca języka.



8. Czy korekta wady zgryzu wpłynie automatycznie na poprawę wymowy?

Nie, korekta wady zgryzu powinna być prowadzona równoległe z terapią logopedyczną.

7. Czy konieczne jest leczenie ortodontyczne?

Tak.

6. Czy międzyzębowość może być przyczyną wady zgryzu dziecka?

Tak, choć często wada wymowy i wada zgryzu mają tę samą przyczynę – nieprawidłową pracę języka.

5. Co może być przyczyną niewłaściwej pracy języka?

- oddychanie przez usta
- choroby układu oddechowego
- zbyt długie karmienie butelką
- długie używanie smoczka
- ssanie palca
- nieprawidłowe polykanie śliny, płynów i pokarmów stałych
- krótkie wędzidełko języka, itd..

* Międzyzębowość występuje również u młodzieży i osób dorosłych. Terapia logopedyczna powinna być podjęta niezależnie od wieku.

Opracowanie:
dr Iwona Michalak-Widera, dr Lucja Skrzypiec,
dr Joanna Trzaskalik
Korekta: Patrycja Keiser
Opracowanie graficzne: Dorota Salska, www.pedagogia.pl